



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

STATE COMMITTEE  
FOR VETERINARY MEDICINE OF UKRAINE

## РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні та на основі висновку Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини

препарат Адвокат® для собак

у формі крапель для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення (юридична особа, відповідальна за препарат)

*фірма Байер Енімал Хелс ГмбХ  
D-51368, Леверкузен  
Німеччина*

zareєстровано в Україні за № 4050-01-770-06/1 від 24.12.2008 р.

Виробник :

*фірма КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ  
Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль  
Німеччина*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 26.12.2011 р.

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Голова Державного комітету ветеринарної медицини  
України - Головний державний інспектор ветеринарної  
медицини  
Chairman of the State committee for veterinary medicine of  
Ukraine - Chief state inspector of Veterinary Medicine



**Г.Б.Іванов**

**ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА**  
**(Настанова по застосуванню)**  
**Адвокат® для собак**

**Опис**

Прозорий розчин.

**Склад**

11 піпетка містить діючі речовини: 10% імідаклоприду та 2,5% моксидектину;  
допоміжні речовини: бензиловий спирт, 0,1 % бутилгідрокситолуен (Е 321, як антиоксидант).  
Кожна доза (піпетка) Адвокату® для собак містить:

	Піпетка	Імідаклоприд	Моксидектин
Адвокат для маленьких собак ( $\leq 4$ кг)	0,4 мл	40 мг	10 мг
Адвокат для середніх собак ( $>4-10$ кг)	1,0 мл	100 мг	25 мг
Адвокат для великих собак ( $>10-25$ кг)	2,5 мл	250 мг	62,5 мг
Адвокат для дуже великих собак ( $>25-40$ кг)	4,0 мл	400 мг	100 мг

**Фармакологічні властивості**

**АТС vet: QP54AB02, QP53AX17.**

Адвокат® спот-он розчин для собак – це ендопаразитицид місцевого застосування. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

**Імідаклоприд**, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинових ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до паралічу та загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає ЦНС ссавців.

**Моксидектин**, 23-(O-methyloxime)-F28249 альфа - належить до другого покоління макроциклічних лактонів до групи мільбеміцинів. Це паразитицид, який діє проти багатьох енто- та ектопаразитів. Моксидектин активний проти личинок *Dirofilaria immitis*. Також він активний проти гастроінтестинальних нематод. Моксидектин взаємодіє з гама-аміно-масляною кислотою та з глутаровими хлорними каналцями паразитів. Це призводить до відкриття хлорних каналців у постсинаптичному просторі. Збільшення кількості іонів хлору призводить до незворотнього зниження м'язової активності, паралічу та загибелі паразитів.

**Застосування**

Для лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях:

- попередження зараження блохами (*Ctenocephalides felis*);
- вошами та волосоїдами (*Trichodectes canis*);
- лікування отодектозу (спричиненого *Otodectes cynotis*);
- лікування саркоптозу (спричиненого *Sarcoptes scabiei var. canis*);
- лікування демодектозу (спричиненого *Demodex canis*);
- попередження дирофіляріозу (мікродирофілярії (личинки) L3 та L4 *Dirofilaria immitis*);
- лікування ангіостронгілозу (*Angiostrongylus vasorum*);
- лікування гастроінтестинальних нематодозів (личинки (L4), незрілі та зрілі *Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum* та *Uncinaria stenocephala*, імаго *Toxascaris leonina* та *Trichuris vulpis*).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

### Дозування

Мінімальна рекомендована доза імідаклоприду - 10 мг/кг маси тіла та моксидектину - 2,5 мг/кг маси тіла, що еквівалентно 0,1 мл Адвокату® на 1 кг маси тіла для собак.

Схема дозування Адвокату® для собак:

Вага собаки (кг)	Розмір піпетки	Об'єм, (мл)	Імідаклоприд (мг/кг ваги)	Моксидектин (мг/кг ваги)
≤ 4 кг	Адвокат® для маленьких собак	0,4	Мінімум 10	Мінімум 2,5
> 4 - 10 кг	Адвокат® для середніх собак	1,0	10-25	2,5-6,25
> 10 – 25 кг	Адвокат® для великих собак	2,5	10-25	2,5-6,25
> 25 – 40 кг	Адвокат® для дуже великих собак	4,0	10-16	2,5-4
> 40 кг	Відповідна комбінація піпеток			

### Лікування та попередження зараження сифоноптерозом.

Одноразова обробка препаратом попереджує зараження блохами протягом 4-х тижнів, але личинки в оточуючому середовищі можуть з'являтися до 6 тижнів і довше залежно від кліматичних умов. Тому було б доцільно поєднувати обробку тварини препаратом Адвокат® з обробкою місць проживання тварини (навколишнє середовище) з метою переривання життєвого циклу бліх.

При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат рекомендується застосовувати щомісяця.

### Лікування отодектозу.

Одноразова обробка препаратом. За рекомендацією ветеринарного лікаря можлива повторна обробка через 30 діб. Не наносити безпосередньо у вушний простір.

### Лікування корості (спричиненої *Sarcoptes scabiei var. canis*)

Лікування проводять двічі (по 1 дозі, вказаній в таблиці) з інтервалом 4 тижні.

### Лікування демодекозу (спричиненого *Demodex canis*)

Адвокат® застосовують 2-4 рази з інтервалом у 1 тиждень.

### Попередження дирофіляріозу

Препарат застосовують за місяць до очікуваної активності кровосисних комах, протягом усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або протягом всього року. Обробку тварин рекомендується проводити в один і той же день місяця.

### Лікування ангіостронгільозу.

Одноразова доза. За рекомендацією ветеринара можлива повторна обробка через 30 діб.

### Нематодози, цестодози, анкілостомози.

У зонах благополучних по дирофіляріозу препарат застосовують як сезонну обробку проти бліх та гастроінтестинальних гельмінтозів.

Дослідженнями встановлено, що щомісячна обробка собак попереджує зараження *Uncinaria stenocephala*.

### Порядок застосування.

Препарат застосовують лише зовнішньо.

Візьміть піпетку з препаратом, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть ковпачок та одягніть на піпетку, видаливши фольгу.

### Для собак до 25 кг:

Собак обробляють в стоячому положенні. Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. По можливості препарат наносять на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб весь вміст нанести безпосередньо на шкіру.

### Для собак вагою більше 25 кг:

Собак обробляють в стоячому положенні. Вміст піпетки наносять у 3-4 точки вздовж хребта: починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерстний покрив так, щоб було видно шкіру. По можливості препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку так, щоб

вміст піпетки рівномірно нанести вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та можливості злизування твариною нанесеного засобу.

#### ***Протипоказання***

Не застосовувати цуценятам віком до 7-ми тижнів, масою тіла до 1 кг.

Лікування хворих та ослаблених тварин, а також масою до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

#### ***Застереження***

Препарат наносити лише на поверхню шкіри, не застосовувати орально чи парентерально. Наносити лише на непошкоджену шкіру.

Після застосування препарату не допускати попадання тварини у відкриті водоймища. Часте купання шампунем може знизити ефективність Адвокату®.

При ознаках ускладнень у тварин при застосуванні препарату необхідно утриматися від його подальшого застосування і проконсультуватися з ветеринарним спеціалістом.

Перед застосуванням препарату необхідно уважно прочитати листівку-вкладку.

Під час обробки тварин не можна палити, пити і приймати їжу.

При обробці тварин препаратом рекомендується користуватися захисними рукавичками.

По закінченні обробки необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки необхідно ретельно змити їх проточною водою. Якщо подразнення шкіри або очей не проходить, або препарат випадково потрапив у шлунково-кишковий тракт необхідно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку з упаковки.

Використані піпетки з-під препарату запаковують в поліетиленовий пакет та викидають у контейнер для сміття.

#### ***Форма випуску***

Розмір упаковки: піпетки по 0,4 мл; 1,0 мл; 2,5 мл та 4,0 мл;

піпетки запаковані в блістери по 3, 4 або 6 штук.

Пакувальний матеріал: білі поліпропіленові туби з ковпачками, що відкручуються.

#### ***Зберігання***

Зберігати препарат у закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30° С.

Термін придатності -3 роки

***Тільки для ветеринарного застосування!***

#### ***Власник реєстраційного посвідчення:***

Байер Енімал Хелс ГмбХ, Леверкузен, Німеччина

#### ***Виробник готового продукту:***

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина